

# Algoritmos para el diagnóstico de las hepatitis virales



Presidenta de la Nación  
**Dra. Cristina Fernández de Kirchner**

Ministro de Salud  
**Dr. Juan Luis Manzur**

Secretario de Promoción y Programas Sanitarios  
**Dr. Jaime Lazovski**

Subsecretaria de Promoción y Control de Riesgos  
**Dra. Marina Kosacoff**

Director de Sida y ETS  
**Dr. Carlos Falistocco**


Coordinadora del Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales  
**Dra. Gabriela Vidiella**

Autores  
**María Belén Bouzas, Fabián Fay, María Cristina Cañero Velasco, Emma Coronel, Joaquín Solari, Gabriela Vidiella, Patricia Angeleri, Carlos Falistocco.**

Edición y corrección  
**Cecilia Dávila**


Diseño y diagramación  
**Carolina Berdiñas**

# Algoritmo de diagnóstico para hepatitis B (VHB) en embarazadas




\* Se sugiere repetir HBsAg en el tercer trimestre de gestación.

# Algoritmo de diagnóstico de hepatitis B



\* Derivar al especialista.


# Algoritmo de diagnóstico ante sospecha de hepatitis A aguda



## \* IMPORTANTE


Consignar con la mayor precisión posible: domicilio, teléfono, edad y antecedentes de vacunación y tomar muestra de materia fecal en tubo seco tipo Eppendorf lo más precozmente posible y derivar (conjuntamente con el suero) al Laboratorio Nacional de Referencia para su genotipificación.

# Algoritmo diagnóstico para hepatitis C



\* En la mayoría de los casos no requiere ningún otro estudio. Si se quiere diferenciar entre un verdadero positivo y un falso positivo biológico y el ensayo utilizado no dispone de relación de positividad, repetir el estudio con otro ensayo para Ac anti VHC o LIA. Frente a evidencia clínica de enfermedad o exposición en los últimos 6 meses es aconsejable realizar seguimiento con pruebas moleculares.


# Algoritmo de seguimiento de hijo de madre con serología VHC positivo



\* IgG VHC puede ser positivo hasta los 18 meses de vida

\*\* Si la madre tiene viremia >10<sup>6</sup> UI/ml y/o infección con VIH, tiene mayor riesgo de transmisión al RN.

# Algoritmo de seguimiento de hijo de madre con serología HBsAg positivo





**PROGRAMA NACIONAL  
DE HEPATITIS VIRALES**

**Programa Nacional de  
Control de las Hepatitis Virales**

Av. 9 de Julio 1925, piso 9 - Ala Moreno  
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(005411) 4379-4842  
[pnhepatitis@msal.gov.ar](mailto:pnhepatitis@msal.gov.ar) - [www.msal.gov.ar/sida](http://www.msal.gov.ar/sida)



Ministerio de  
Salud  
Presidencia de la Nación

**ARGENTINA  
NOS INCLUYE**