

Capacitación Vacuna contra el SARS-CoV-2 COVID-19

Lineamientos de vacunación Sputnik V Segundo Componente

Programa de Inmunizaciones
Dirección General de Atención Primaria
18-01-21




Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Sputnik V



- Vacuna que utiliza ARN mensajero
- Con 2 vectores distintos de Adenovirus: el adenovirus recombinante tipo 26 (rAd26) y el vector rAd5, a los cuales se les ha incorporado el gen que codifica para glicoproteína *spike* de virus SARS-CoV-2 (abreviados rAd26-S y rAD5-S, respectivamente).
- Tras la vacunación, se genera una respuesta inmune contra la glicoproteína S



Buenos Aires Ciudad



Ministerio de Salud

Sputnik V

Tapa o franja AZUL para el Componente 1 (rAd26-S)



Tapa VERDE para el Componente 2 (rAd5-S)



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Esquema de vacunación con vacuna Sputnik V

Composición	1° dosis: 1° componente (rAd26S) Tapa azul 2° dosis: 2° componente (rAd5S) Tapa verde
Esquema	2 dosis Respetando el orden de los componentes
Lugar de vacunación y vía	Deltoides, intramuscular
Dosis	0,5 ml
Intervalo entre dosis	Mínimo 21 días- La 2° dosis se podrá comenzar a aplicar a partir del día 21. NO PUEDE ADELANTARSE
Intercambiabilidad	El esquema debe completarse con la misma vacuna que se inicio la vacunación A la fecha no se cuenta con la información que avale el intercambio de diferentes vacunas
Edad de utilización	18 a 59 años. No utilizarse a partir de los 60 años 0 día



Buenos Aires Ciudad



Importante

- Para lograr la máxima protección se debe completar el esquema de 2 (dos) dosis, aunque transcurran más días que los recomendados como intervalo mínimo.
- No se reiniciarán esquemas en ningún caso, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la aplicación de la primera dosis.
- La protección de la vacuna no es inmediata: **la vacunación contempla una serie de 2 dosis y tomará de 1 a 2 semanas luego de la segunda dosis para considerar que la protección es adecuada.**



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Sputnik V



SEGUNDO COMPONENTE

- Formulación líquida: conservación a -18°C
- Previo a la aplicación, debe descongelarse a temperatura ambiente, hasta que se convierta en una solución homogénea, incolora, ligeramente opalescente.
- Antes de la aplicación realizar un cuidadoso balanceo del vial
- Una vez descongelada, debe administrarse en los siguientes 30 minutos.
- NO se puede volver a congelar
- NO almacenar el vial una vez abierto, debe utilizarse dentro de los 30 minutos.





Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Condiciones de conservación

- **La vacuna es termolábil y debe almacenarse** en un lugar oscuro.
- Se requiere de una cadena de frío que asegure una temperatura de congelación de -18°C
- Todas las etapas de almacenamiento y transporte desde el momento de la producción hasta el momento de su uso deben asegurar la cadena de frío.
- Una vez descongelada, usar dentro de los 30 minutos de descongelación.



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires



El vial trae 3 ml

Para la obtención de 5 dosis de 0,5 ml
cada una

Puede salir una 6° dosis de 0,5 ml
excepcionalmente



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Coadministración con otras vacunas

- La coadministración de la vacuna SPUTNIK V con otras vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada.
- Por este motivo, y hasta tanto se tenga más información al respecto, se recomienda respetar un **intervalo de 4 semanas** con la aplicación de otras vacunas.
- En el caso de haberse aplicado simultáneamente con otra vacuna o con un intervalo menor a 4 semanas, deberá realizarse la notificación correspondiente del ESAVI, y a la fecha no está indicado aplicar nuevamente ninguna de las vacunas administradas



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Eventos adversos

- **Locales:** dolor en el lugar de la inyección, hiperemia, hinchazón
- **Generales:** reacciones a corto plazo como síndrome pseudogripal de corta duración (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, dolor de cabeza).
- Se recomienda el uso de AINEs/paracetamol ante la aparición de fiebre después de la vacunación.



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Contraindicaciones para ambos componentes

- Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares; y antecedente de reacciones alérgicas graves
- Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas)
- Exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general
- Inmunocopromiso y enfermedades autoinmunes (no hay datos a la fecha)
- Embarazo y período de lactancia
- Menores de 18 años y de 60 años y más



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Contraindicaciones para la administración del Componente 2

Complicaciones graves posvacunación luego de haber recibido el Componente 1 de la vacuna

- Shock anafiláctico
- Reacciones alérgicas generalizadas y graves
- Síndrome convulsivo
- Fiebre superior a 40° C



No pueden recibir el Componente 2



Buenos Aires Ciudad



Muchas gracias!!



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires